



Phillip Agrusa, MD • Scott Armstrong, MD • Theodore Colwell, MD • John Dufurrena, MD
Jessica Fu, MD • Lee Parsons, MD • Michael Robinson, MD • Harmony Schroeder, MD • Becky Uranga, MD
Jill Dawson, CRNP • Amy English, CRNP • Jen Newman, CRNP MS • Julie Stevens, CRNP

3520 E Louise Dr • Meridian, ID 83642 • phone 208.888.0909 • fax 208.888.5825
315 Elm St, Ste. 310 • Caldwell, ID 83605 • phone 208.454.2035 • fax 208.454.1065
3101 E State St., Ste. 2100 • Eagle, ID 83616 • phone 208.938.2220 • fax 208.938.2235

EXPLICACION DE RIESGOS QUIRURGICOS

A. Los Riesgos Asociados Con Todo Tipo De Cirugia

1. *Los Riesgos Relacionada Con Anestesia*

Estos varian de complicaciones menores - como un dolor de garganta, a otros mas graves - como un ataque de paralisis or hasta muerte. Reacciones inesperadas pudden resultar de cualquier droga o anestesia. Los riesgos asociados con anestesia son mas evidentes en los pacientes que fuman. Los pacientes que fuman deben considerar retrasar la cirugia hasta varias semanas despues de terminar de fumar.

2. *Sangriado*

Casi todas las cirugias estan asociadas con up poco de sangria. Pero, es raro perder tanta sangre que se necesita una transfusion sanguinea. Si es necesario tener una transfusion sanguinea, los doctores discutirian todo con el paciente, excepto en la situacion de vida o muerte. Toda sangre que se usa en transfusiones ha sido sometida a examinacion de hepatitis y del virus del SIDA. El riesgo de estar positivo de SIDA a causa de una transfusion es muy pequeno, pero no cero. Tambien, el riesgo de contraer hepatitis por causa de una transfusion sanguineo es pequerio. Los miembros de su familia no pueden dar sangre para su cirugia. Hay muchos anticuerpos que tienen que ser equiparar, que es extremadamente improbable que sus parientes se sean donadores compatibles. Los pacientes frecuentamente preguntan acerca de donar su propia sangre por adelantado. Esto se llama ser un donador autologous. Para beneficiar de esto, necesitaria donar sangre un mes antes de su cirugia para que su cuerpo pueda reforzar las celulas rojas de nuevo. Esto solo es practico cuando es evidente que vaya a perder una suma significativa de sangre durante la cirugia y la cirugia seria planeada muchas semanas por adelantado.

3. *Infeccion*

Infeccion siempre es una posibilidad. La experiencia ha demostrado que ciertas operaciones estan asociadas con un riesgo mas grande de infeccion. Si esto es el caso con la cirugia que Ud va a tener, recibira antibioticos inmediatamente antes de la cirugia en la sala de operaciones. Recibiendo antibioticos o teniendo una cirugia que no requiere antibioticos antes, no garantiza que una infeccion no ocurra.

4. *Los Sintomas Post-Operativos*

Muchas cirugias son acompanades por dolor post-operativo. Recibira medicaciones de dolor para que pueda estar lo mas comodo posible. Nausea, vomito, dolores gastricos, y dolores de cabeza pueden ocurrir tambien. Los pacientes que estan preparados bien para cirugia pueden tolerar las incomodidades mejor.

5. *Curacion Mala...Las Cicatrices.....Necesidad De Mas Cirugia*

Es dificil pronosticar cuales pacientes van a cicatrizar mal. Pacientes que son obesos, tambien, tienen un riesgo aumentado. Se anticipa que cada paciente mejorara despues de la cirugia, pero no es posible garantizar esto. A vecces, pacientes necisitan otra cirugia mas tarde.

Casi todas las cirugias estan asociadas con un poco de cicatrizaje, que puede ser externo o interno. Las cicatrices internas se llaman adhesiones y pueden resultar en obstruccion de los intestinos, infecundidad, o dolores cronicos. En cualquier cirugia, conclusiones al tiempo de la operacion o complicaciones que existen durante la cirugia pueden requerir de una cirugia mas wextensiva de lo que se anticipaba.

B. Los Riesgos Asociados Con Cirugia Pelviana

1. Lesiones A Las Estructuras Pelvianas

Las estructuras pelvianas que podrian tener lesiones durante la cirugia incluyen, pero no son limitadas a: utero, tubos de Falopio, ovarios, vejiga, utetras (tubos conectando los rinones a la vejiga), intestinos, arteria, nervios. Muchas arterias y nervios que estan en el pelvis van a las piernas. Si hay una lesion, puede requerir cirugia inmediata o mas tarde. Muchas de las lesiones no resultan en problemas permanentes, pero si existe una posibilidad.

2. Coagulos De Sangre

Cirugia pelviana esta asociada con riesgos de coagulos de sangre. Si estos coagulos se rompen y van a los pulmones, puede ser fatal. Si vas a tener una cirugia mayor, recibiras precauciones que pueden reducir, pero no eliminar, estos riesgos. Es importante que reporte algua historia personal o de su familia acerca de los coagulos de sangre.

3. Actividad Sexual

Muchas cirugias ginecologicas requieren un periodo de abstinencia de actividad sexual en el perioda despues de la operacion. Muchos pacientes, aunque despues de una histerectomia, no creen que su vida sexual esta afectada mucho. Algunas, sin embargo, reportan que la calidad de orgasmo es diferente o que su libido esta decrecido. Por favor, discutan cualquiera de estos asuntos con su doctor.

4. Dificultades Orinarias

Muchos pacientes no pueden orinar inmediatamente despues de la cirugia. Muchas veces, un cateder esta puesto en la vejiga para mantener la vacia. Algunos tipos de cirugia vaginal pueden requerir un cateter que se mantendran en lugar por días o semanas. Si su doctor piensa que va a necesitar un cateter suprapubico. Discute esto con su doctor.

RESUMEN

Hasta con las mejores precauciones, todas las cirugias tienen riesgo de resultar adversas. Es importante que este enterado de estos riesgos y comparar los riesgos y beneficios de la cirugia. Su doctor es la mejor persona para ayudarle en este proceso, pero Ud debe ser un participante activo y avisarle a su doctor de sus preocupaciones. Siempre tiene Ud el derecho a una segunda opinion.

Nombre Del Paciente: _____ Nombre Del Doctor: _____

Tipo De Cirugia: _____

Informacion Especifica De Mi Cirugia: _____

He Leido Este Documento Y He Tenido La Oportunidad De Hacer Preguntas.

Firma Del Paciente: _____ **Fecha:** _____

Testigo: _____